

(21211) - DOENÇA DE CROHN, UMA APRESENTAÇÃO RARA

Miguel Rodrigues¹; João Luís Pinheiro¹; Maria João Ferriera¹; Eugénia Cancela¹; Fernando Valério¹; Carlos Casimiro¹; Jorge Pereira¹

1 - Centro Hospitalar Tondela Viseu

Introdução: A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal cuja incidência anual na Europa atinge os 12/100000 casos. A idade de início dos sintomas é variável, bem como a localização da doença e o seu comportamento. Apesar de no decurso da evolução da doença quase 70% dos doentes necessitarem de intervenção cirúrgica, esta abordagem em contexto emergente, por doença de Crohn, é hoje menos frequente. Podendo acontecer por oclusão intestinal ou perfuração, sendo a hemorragia, como causa de choque hipovolémico, de extrema raridade.

Objetivo: Demonstrar a importância da multidisciplinaridade também em contexto de urgência e o papel da cirurgia na doença de Crohn grave, num caso de apresentação rara.

Resumo do caso: Doente de 18 anos, M, asmático. Dois familiares diretos com doença de Crohn, sem outros antecedentes de relevo. Diagnóstico de doença de Crohn no mesmo ano, classificado como A2L1B1. Sem alterações tromboembólicas no estudo diagnóstico realizado. A cumprir terapêutica médica com ustekinumab nos últimos dois meses. Deu entrada no SU cerca de 5 meses após o diagnóstico, em choque hemorrágico por episódio de hematoquezias. Após ressuscitação e estabilização hemodinâmica, a equipa multidisciplinar constituída por gastroenterologistas e cirurgiões decidiu pelo seu internamento para otimização de terapêutica médica, vigilância apertada e estudo adicional. Em D7 novo episódio de hemorragia digestiva, com necessidade transfusional de 4 unidades de GV. Foi proposta abordagem conjunta com a gastroenterologia no bloco operatório. Foi realizada enteroscopia intraoperatória com assistência por laparotomia mediana. Identificado foco hemorrágico activo no íleon terminal a cerca de 10cm da válvula ileo-cecal e extensa área de doença inflamatória extensa, friável, com múltiplas erosões, da válvula ileocecal até 30cm proximais. Foi realizada ileo-cecsectomia e anastomose latero-lateral mecânica. Realizou 6 UCE no total.

Alta em D7 PO, sem outras intercorrências.

Relevância: Descrever e sensibilizar para um caso de apresentação rara e possivelmente fatal da doença de Crohn, o choque hemorrágico, demonstrando a importância da multidisciplinaridade na sua abordagem.

Palavras-chave : Cross, DII, Apresentação rara;