

**(21357) - ABORDAGEM LAPAROSCÓPICA DA NEOPLASIA DO ÂNGULO ESPLÉNICO DO CÓLON – ABORDAGEM STEPWISE**

Catarina Ortigosa<sup>1</sup>; Ana Rita Ferreira<sup>1</sup>; Bárbara Castro<sup>1</sup>; Sílvia Costa<sup>1</sup>; Bela Pereira<sup>1</sup>; Tatiana Queirós<sup>1</sup>; João Cardoso<sup>1</sup>; Manuel Oliveira<sup>1</sup>

1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho

**INTRODUÇÃO:** Os tumores do ângulo esplénico do cólon representam cerca de 2-8% das neoplasias colorretais. A abordagem laparoscópica destes tumores é atualmente considerada gold-standard, resultando em melhores outcomes para o doente.

**MÉTODOS:** Os autores apresentam um vídeo de uma cirurgia laparoscópica da neoplasia do ângulo esplénico do cólon, enfatizando os passos-chave deste procedimento.

**RESULTADOS:** Doente do sexo feminino, 64 anos de idade, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. Apresenta-se na consulta com queixas de obstipação com cerca de 3 meses de evolução, pelo que se iniciou a investigação diagnóstica. Realizou colonoscopia, que revelou um adenocarcinoma estenosante do ângulo esplénico a 49cm da margem anal. Foi estadiada com TC tóraco-abdomino-pélvico como cT3N+M0. Após discussão em Consulta de Grupo Multidisciplinar (CGM), foi proposta para cirurgia.

**DISCUSSÃO:** Doente submetida a colectomia esquerda radical laparoscópica com anastomose intra-corpórea. O procedimento decorreu sem intercorrências.

**CONCLUSÃO:** A colectomia esquerda radical com anastomose intra-corpórea é procedimento desafiante e tecnicamente complexo, sendo a via minimamente invasiva a que permite melhores outcomes para o doente.

**Palavras-chave :** cólon, ângulo esplénico, laparoscopia